

گرفتاری ایزوله کمپلکس هسته زوج ۳ متعاقب خونریزی مغز میانی (گزارش یک مورد)

*کریم نیکخواه^۱ MD، دکتر پیام ساسان نژاد^۲ MD، دکتر محمدتقی فرزاد^۳ MD

^۱دانشیار، ^۲متخصص نورولوژی، ^۳دستیار نورولوژی - گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۳/۱۱ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۱۰/۸

خلاصه

مقدمه: فلج عصب زوج ۳ کرانیال یک طرف همراه با گرفتاری عضله رکتوس فوقانی و افتادگی پلک دو طرف، از علائم تیبیک درگیری کمپلکس هسته زوج ۳ می باشد. ر این بیماران، سایر معاینات عصبی طبیعی است و اختلال منحصر به علائم چشمی می باشد. هدف از ارائه این مقاله مروری بر خونریزی های ناحیه مغز میانی و معرفی یک مورد نادر با درگیری کمپلکس هسته عصب زوج ۳ می باشد.

معرفی بیمار: بیمار مرد ۵۹ ساله ای است که با افتادگی ناگهانی پلک دو طرفه و عدم توانایی در باز کردن چشمها مراجعه کرده بود. سابقه پرفشاری بد کنترل شده را در گذشته داشته است. در معاینه عصبی، فلج زوج ۳ چپ (محدودیت حرکت چشم به داخل، بالا پائین، میدریاز و پتوز) همراه با محدودیت حرکت چشم راست به بالا و افتادگی پلک طرف راست وجود داشت. سایر معاینات نورولوژیک طبیعی بود. سی تی اسکن مغز، خونریزی مغز میانی را در قسمت فوقانی و با تمایل به سمت چپ نشان داد.

واژه های کلیدی: خونریزی مغز میانی، عصب اکولوموتور، کمپلکس هسته ای عصب اکولوموتور