

گزارش یک مورد آندومتریوزیس پولیپوئید سیگموئید با شباهت به کانسر کولون  
\*سکینه عمومیان<sup>۱</sup> MD، عباس اسماعیلزاده<sup>۲</sup> MD، ناصر طبیبی<sup>۳</sup> MD، مهدی فرزادنیا<sup>۴</sup> MD

### آرمنی عطارانزاده MD<sup>۰</sup>

<sup>۱،۳،۴</sup> استادیار پاتولوژی، <sup>۲</sup> استادیار داخلی، <sup>۵</sup> دستیار پاتولوژی

تاریخ دریافت: ۸۴/۹/۶ - تاریخ پذیرش: ۸۴/۱۰/۲۸

### خلاصه

آندومتریوز روده‌ای یک عارضه نادر اما از نظر بالینی مهم می‌باشد. شایعترین نواحی درگیر رکتوسیگموئید و سپتوم رکتوفوازینال است. اگر چه درگیری سروز روده در زنان در سنین باروری ناشایع نیست، اما ابتلای مخاطی نادر بوده و ممکن است تشخیص افتراقی آن از کانسر کولون به دلیل عدم وجود علایم اختصاصی و نیز کاربرد تشخیصی ضعیف اندوسکوپی و بیوپسی کولون مشکل باشد. در این گزارش، خانم ۳۱ ساله‌ای با آندومتریوز روده‌ای در ناحیه کولون سیگموئید معرفی شده که با رکتورازی مراجعه کرده و بررسی‌های اولیه کانسر کولون را برای ایشان مطرح بود. شواهد بافت‌شناسی در بیوپسی که حاصل بررسی‌های کولونوسکوپی مکرر همراه با مرور سابقه بالینی بود، تشخیص نهایی اندومتریوز روده‌ای را مسجّل گردانید.