

ارزیابی میزان جرم دندان‌ها در بیماران مبتلا به سنگ کلیوی

دکتر ناصر سرگلزایی*#، دکتر محمد حسن نجفی*، دکتر محمد محمدزاده رضایی**، دکتر مرتضی طاهری***، دکتر بهزاد اکاتی****

* استادیار گروه پرپودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

** دانشیار گروه ارولوژی بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

*** دانشیار گروه پرپودانتیکس دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

**** دندانپزشک

تاریخ ارائه مقاله : 13/11/85 - تاریخ پذیرش : 5/5/86

مقدمه:

تعدادی گزارش مبنی بر تغییرات دهانی در بیماران با بیماریهای کلیوی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به استوماتیک اورمیک، خونریزی خود بخود، افزایش بیماری پرپودنتال، خشکی دهان و افزایش رسوب جرم اشاره نمود. با توجه به ترکیب ساختمانی و نحوه شکل‌گیری نسبتاً یکسان سنگهای کلیوی و جرم‌های دهانی بر آن شدیم که تحقیقی پیرامون بررسی میزان جرم‌های دهانی در بیماران مبتلا به نفرولیتیا انجام دهیم.