

مورد نگاری

آشنایی با اشکال دارویی شبه آمفتامینی در ایران و معرفی چهار مورد با عوارض نروواسکولر

تاریخ دریافت: ۸۷/۳/۵ - تاریخ پذیرش: ۸۷/۱۰/۳، تاریخ بازنگری: ۸۸/۴/۵

خلاصه

مقدمه

کریستال داروی جدیدی است که اخیراً در ایران به طور غیر قانونی و به میزان زیاد مصرف می شود. سوء مصرف این داروها می تواند باعث عوارض حاد و کشنده گردد. هدف از این گزارش هشدار درباره خطرات کشنده این دارو و معرفی نوع خاصی که در ایران منجر به مرگ می شود و همچنین توضیح عوارض نروولوژیک آنست.

گزارش موارد

بیمار اول: مرد ۲۶ ساله که به دنبال مصرف کریستال دچار فلج اندامهای تحتانی گردید و در نهایت با وقفه قلبی تنفسی درگذشت. بیمار دوم: زن ۴۵ ساله ای که به دلیل مصرف کریستال با تشنج و اختلال هوشیاری به اورژانس اعصاب بیمارستان قائم آمد. سرانجام به دلیل ایست قلبی فوت نمود. بیمار سوم مرد ۳۲ ساله است که به دنبال مصرف مقادیر زیاد قرص های نشاط آور و کریستال دچار پاراپلژی شل شد. بر روی بدن بیمار راشهای پوستی واسکولیتی منتشر وجود داشت. بیمار علی رغم اقدامات درمانی، درگذشت. بیمار چهارم مرد ۲۳ ساله ای است که به دنبال مصرف مقادیر زیاد کریستال به صورت تدخین و همچنین مصرف همزمان قرصهای نشاط آور دچار تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه گردید. در نهایت بیمار با حال عمومی خوب مرخص گردید.

نتیجه گیری

اخیراً متأسفانه مصرف داروهای نشاط آور در ایران زیاد شده است. این مقاله در مورد عوارض نروولوژیک این قبیل داروها هشدار می دهد.

کلمات کلیدی: کریستال، اکستیزی، آمفتامین

۱ کریم نیکخواه*
۲ پیام ساسان نژاد
۳ محمد آردم
۴ رضا کیانی

۱- دانشیار گروه مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۲- استادیار گروه مغز و اعصاب، بیمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
۳- فارماکولوژیست، مشهد، ایران
۴- متخصص مغز و اعصاب، مشهد، ایران

*مشهد - بیمارستان قائم (عج)، گروه اعصاب
تلفن: ۹-۸۴۰۰۰۱-۵۱۱-۹۸+
email: Nikkhahk@mums.ac.ir